

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo prima di assumere o fare uso del medicamento. Questo medicamento le è stato prescritto personalmente e quindi non deve essere consegnato ad altre persone, anche se i sintomi sono gli stessi. Il medicamento potrebbe nuocere alla loro salute.

Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

CABOMETYX® 20 mg, 40 mg, 60 mg compresse rivestite con film

Ipsen Pharma Schweiz GmbH

Che cos'è CABOMETYX e quando si usa?

CABOMETYX è un medicamento contro il cancro, contenente il principio attivo cabozantinib.

Viene utilizzato negli adulti:

- dopo una precedente terapia, per il trattamento degli stadi avanzati di un particolare tipo di cancro ai reni, il carcinoma a cellule renali;
- per il trattamento del cancro al fegato dopo una precedente terapia con un determinato medicamento (sorafenib);
- per il trattamento dei tumori neuroendocrini – ovvero tumori che hanno origine nel pancreas, nello stomaco, nell'intestino, nei polmoni o in altri organi – in stadio avanzato. Viene impiegato quando i pazienti con questi tumori non rispondono più a una precedente opzione terapeutica, quando il tumore non può essere rimosso chirurgicamente o quando il tumore si è diffuso.

CABOMETYX è anche usato negli adulti per il trattamento di un tipo di tumore della ghiandola tiroidea (il cosiddetto carcinoma differenziato della tiroide) localmente avanzato o metastatico, quando i trattamenti con iodio radioattivo e determinati farmaci antitumorali non fermano più la progressione della malattia.

CABOMETYX può essere somministrato anche in associazione a nivolumab per il trattamento di prima linea del cancro ai reni in stadio avanzato negli adulti con profilo di rischio intermedio/sfavorevole.

CABOMETYX blocca l'azione di alcune proteine, i cosiddetti recettori tirosin chinasi (RTK), che contribuiscono alla crescita cellulare e allo sviluppo di nuovi vasi sanguigni a supporto delle cellule. Queste proteine possono essere presenti in gran numero nelle cellule cancerose. Bloccando la loro azione, CABOMETYX può rallentare il tasso di crescita del tumore e contribuire a ostacolare l'apporto di sangue da cui dipende il tumore.

Quando non si può assumere CABOMETYX?

Non può assumere CABOMETYX se è allergico a cabozantinib o a una qualsiasi delle sostanze ausiliarie di questo medicamento.

Quando è richiesta prudenza nella somministrazione di CABOMETYX?

La preghiamo di consultare il suo medico o farmacista prima di assumere CABOMETYX se:

- è affetto da ipertensione. Il suo medico controllerà regolarmente la sua pressione sanguigna e potrebbe prescriverle medicinali per abbassare la pressione
- ha o ha avuto un aneurisma (dilatazione e indebolimento della parete di un vaso sanguigno) o una lacerazione della parete di un vaso sanguigno, poiché CABOMETYX può favorirne l'insorgenza
- presenta diarrea, vomito, riduzione dell'appetito o dolore alla bocca
- ha presentato recentemente intensi sanguinamenti
- ha subito un intervento chirurgico durante l'ultimo mese (o se ha in programma un intervento chirurgico), compresi interventi odontoiatrici
- è affetto da una malattia infiammatoria intestinale (p. es. morbo di Crohn, colite ulcerosa, diverticolite o appendicite)



- ha presentato recentemente una trombosi alla gamba, un ictus cerebrale o un infarto cardiaco
- ha insufficienza cardiaca (può includere sintomi come fiato corto, sensazione di stanchezza, svenimenti, gonfiore alle caviglie e alle gambe)
- ha problemi alla tiroide. La sua funzione tiroidea deve essere controllata prima dell'assunzione di CABOMETYX e regolarmente durante il trattamento. Informi il suo medico se si stanca più facilmente, se generalmente sente più freddo delle altre persone o se la sua voce diventa più profonda durante l'assunzione di questo medicamento. Se la sua tiroide non produce abbastanza ormoni tiroidei, potrebbe ricevere una terapia sostitutiva con ormoni tiroidei
- è affetto da disfunzioni del fegato, dei reni o del cuore

Prima dell'inizio del trattamento con CABOMETYX dovrà sottoporsi a un controllo odontoiatrico, che andrà ripetuto a intervalli regolari durante il trattamento:

- Se deve sottoporsi a un trattamento odontoiatrico invasivo o ad un intervento odontoiatrico, comunichi al suo dentista che è in trattamento con CABOMETYX, specialmente se sta assumendo o ha assunto bifosfonati. I bifosfonati sono medicinali per la prevenzione di complicazioni ossee (osteoporosi) e potrebbero esserle stati prescritti per un'altra malattia.
- È importante mantenere una buona igiene orale durante la terapia con CABOMETYX.

Legga anche «Quali effetti collaterali può avere CABOMETYX?».

Informi il suo medico se uno dei casi elencati la riguarda. Potrebbe essere necessario per lei un trattamento, oppure il suo medico potrebbe decidere di modificare la sua dose di CABOMETYX o di terminare il trattamento. Vedere anche «Quali effetti collaterali può avere CABOMETYX?».

CABOMETYX contiene lattosio (un tipo di zucchero). Pertanto, assuma CABOMETYX solo dopo aver consultato il suo medico se è nota una sua intolleranza a particolari tipi di zuccheri.

CABOMETYX contiene meno di 1 mmol di sodio (23 mg) per compressa, cioè è essenzialmente «senza sodio».

Assunzione di CABOMETYX insieme ad altri medicinali

Informi il suo medico o il suo farmacista nel caso in cui soffre di altre malattie, soffre di allergie, o assume o applica esternamente altri medicinali, se ha recentemente assunto o applicato altri medicinali o se ha l'intenzione di assumere o applicare altri medicinali. Ciò è valido anche se si tratta di medicinali non soggetti a prescrizione medica, inclusi i medicinali fitoterapeutici. Questa precauzione è necessaria perché CABOMETYX può interferire con l'azione di alcuni altri medicinali. Viceversa, alcuni altri medicinali possono interferire con l'azione di CABOMETYX. Ciò potrebbe significare che il suo medico dovrà adeguare la dose o le dosi che lei deve assumere. Si raccomanda di informare il suo medico di ogni medicamento che lei assume, in particolare se usa i seguenti medicinali:

- medicinali per la cura delle infezioni da funghi, quali p. es. l'itraconazolo, il ketoconazolo e il posaconazolo
- medicinali per la cura delle infezioni batteriche (antibiotici) quali eritromicina, claritromicina e rifampicina
- medicinali per la cura delle allergie quali fexofenadina
- medicinali per il trattamento dell'angina pectoris (dolore al petto dovuto a un'insufficiente irrorazione del cuore) quali ranolazina
- medicinali per la cura della epilessia o di crisi convulsive quali fenitoina, carbamazepina e fenobarbital
- preparazioni vegetali contenenti erba di San Giovanni (*Hypericum perforatum*), che talora vengono impiegati per la cura della depressione o di stati correlati alla depressione quali l'ansia
- medicinali per rendere il sangue più fluido quali il warfarin (non omologato in Svizzera) o il fenprocumone



- medicinali per la cura della pressione alta del sangue o di altre malattie del cuore quali aliskiren, ambrisentan, dabigatran etexilato, digossina, talinololo e tolvaptan
- medicinali per la cura del diabete quali saxagliptina o sitagliptina
- medicinali per la cura della gotta quali la colchicina (non omologata in Svizzera)
- medicinali per la cura delle malattie da HIV o dell'AIDS quali efavirenz, ritonavir, maraviroc ed emtricitabina
- medicinali per la prevenzione dei rigetti di trapianti (ciclosporina) e regimi basati sulla ciclosporina nella artrite reumatoide e nella psoriasi

Contraccettivi per uso orale

Se durante la terapia con CABOMETYX sta assumendo contraccettivi, questi potrebbero perdere la loro efficacia. Pertanto, durante il trattamento con CABOMETYX e inoltre per almeno 4 mesi dopo la conclusione del trattamento dovrà mettere in atto un ulteriore metodo contraccettivo, a barriera, p. es. un profilattico o un diaframma.

Assunzione di CABOMETYX insieme ad alimenti

È sconsigliato assumere CABOMETYX insieme ad alimenti. Non dovrà mangiare nulla almeno per 2 ore prima di assumere CABOMETYX e per 1 ora dopo l'assunzione del medicamento. Per tutta la durata del trattamento con questo medicamento, eviti di assumere prodotti contenenti pompelmo, infatti, essi possono incrementare la concentrazione di CABOMETYX nel sangue.

Capacità di condurre veicoli e utilizzare macchine

Occorre prudenza durante la guida di veicoli o manovrando macchine. Tenga presente che durante il trattamento con CABOMETYX potrà sentirsi stanco o indebolito e la sua capacità di guidare veicoli o di manovrare macchine potrebbe esserne compromessa.

Si può assumere CABOMETYX durante la gravidanza o l'allattamento?

Durante il trattamento con CABOMETYX occorre evitare una gravidanza. Le donne in età fertile in trattamento con CABOMETYX e le partner di pazienti maschi in trattamento con CABOMETYX dovranno adottare durante il trattamento e per almeno 4 mesi dopo la sua conclusione un metodo contraccettivo adeguato. Consulti il suo medico sui metodi contraccettivi adatti durante il trattamento con CABOMETYX (veda anche più avanti alla sezione «Assunzione di CABOMETYX insieme ad altri medicinali»).

Informi il suo medico se durante il trattamento con CABOMETYX lei/la sua partner va incontro a una gravidanza o desidera programmare una gravidanza.

Parli PRIMA dell'assunzione di CABOMETYX con il suo medico, se lei /la sua partner dopo la conclusione del trattamento desidera procreare. Esiste la possibilità che la sua fertilità sia compromessa dal trattamento con CABOMETYX.

Le donne che assumono CABOMETYX, durante il trattamento e per un periodo di almeno 4 mesi dalla conclusione del trattamento non devono allattare. Il cabozantinib e/o i suoi metaboliti possono passare nel latte materno e danneggiare il bambino.

Come usare CABOMETYX?

Assuma questo medicamento sempre come descritto in questo foglietto illustrativo oppure scrupolosamente secondo gli accordi presi con il suo medico o con il suo farmacista. Se non è sicuro, chieda ancora.

Si consiglia di assumere questo medicamento fino a quando il suo medico non decida di terminare il suo trattamento. Se si presentano gravi effetti collaterali, il suo medico potrà adeguare il dosaggio o terminare il trattamento prima di quanto era stato programmato. Il suo medico le dirà se la sua dose dovrà essere adeguata.

CABOMETYX va assunto una volta al giorno. La dose abituale è di 60 mg. Il suo medico deciderà quale sia la dose adatta per lei.



Se CABOMETYX viene utilizzato in associazione a nivolumab per il trattamento del cancro ai reni in stadio avanzato, la dose raccomandata è di 40 mg di CABOMETYX una volta al giorno.

Non si deve assumere CABOMETYX insieme a un pasto. Non dovrà mangiare nulla almeno per 2 ore prima di assumere CABOMETYX e per 1 ora dopo l'assunzione del medicamento. Ingerisca la compressa rivestita con film con un bicchiere colmo d'acqua. Non deve schiacciare la compressa rivestita con film.

Se avesse assunto una quantità di CABOMETYX maggiore del dovuto

Se avesse assunto una quantità di CABOMETYX maggiore di quanto le era stato prescritto, si rivolga immediatamente a un medico o si rechi presso un ospedale, portando con sé queste compresse rivestite con film e questo foglietto illustrativo.

Se avesse dimenticato di assumere CABOMETYX

- Se fino all'assunzione della sua successiva dose dovranno trascorrere ancora 12 ore o più, assuma la dose dimenticata non appena se ne ricorda. Prenda la dose successiva all'ora abituale.
- Se l'intervallo fino all'assunzione della sua successiva dose fosse inferiore a 12 ore, non assuma più la dose dimenticata. Prenda la dose successiva all'ora abituale.

Non modifichi di propria iniziativa la posologia prescritta. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte, ne parli al suo medico o al suo farmacista.

Se dovesse interrompere l'assunzione di CABOMETYX

Se sospende il trattamento, questo può avere ripercussioni negative sull'efficacia. Perciò, deve parlare assolutamente con il suo medico prima di interrompere il trattamento con CABOMETYX.

Se CABOMETYX è utilizzato in associazione a nivolumab, le verrà prima somministrato nivolumab e poi CABOMETYX.

Si faccia dare informazioni riguardo all'uso e al modo d'azione di nivolumab dal suo medico. Si rivolga al suo medico per qualsiasi ulteriore domanda riguardante questo medicamento.

Bambini e adolescenti

CABOMETYX non è raccomandato per l'uso nei bambini o negli adolescenti.

Quali effetti collaterali può avere CABOMETYX?

Come tutti i medicinali, anche CABOMETYX può avere effetti collaterali, che tuttavia non compaiono necessariamente in ogni paziente. Se dovessero comparire effetti collaterali, il suo medico potrà consigliarle di assumere una dose più bassa di CABOMETYX. Tuttavia, il suo medico potrà anche prescrivere altri medicinali con i quali controllare gli effetti collaterali.

Informi immediatamente il suo medico se dovesse comparire uno dei seguenti effetti collaterali - potrebbe avere bisogno di un trattamento medico urgente:

- sintomi quali dolori addominali, nausea (stimolo a vomitare), vomito, stitichezza o febbre. Questi sintomi potrebbero essere segni di una perforazione (uno strappo o un foro) nel tratto gastrointestinale. L'apertura che si forma nello stomaco o nell'intestino può mettere a rischio la vita
- sanguinamenti gravi o non controllabili con sintomi quali vomito di sangue, feci nere, sangue nelle urine, mal di testa o tosse con espettorazione di sangue
- gonfiore, dolori alle mani e ai piedi o difficoltà respiratoria
- una ferita che non guarisce
- crampi, mal di testa, disorientamento o difficoltà a concentrarsi. Questi sintomi possono essere indicativi della cosiddetta sindrome da leucoencefalopatia posteriore reversibile (RPLS)
- sensazione di stordimento, confusione o perdita di conoscenza, che può essere dovuta a problemi al fegato



- dolore alla bocca, mal di denti e/o dolore alla mascella, gonfiore o piaghe in bocca, intorpidimento o sensazione di pesantezza alla mandibola o allentamento di un dente. Questi potrebbero essere i segni di un danno all'osso mandibolare (osteonecrosi)

Altri effetti collaterali, associati all'assunzione di CABOMETYX da solo, comprendono:

Molto comune (riguarda più di 1 utilizzatore su 10)

- Disturbi di stomaco, compresi diarrea, nausea, vomito, stitichezza, disturbi digestivi, dolori addominali
- Vesciche, dolori alle mani o alle piante dei piedi, eruzione cutanea o arrossamento cutaneo
- Riduzione dell'appetito, perdita di peso, disturbi del gusto
- Spossatezza, debolezza, mal di testa, vertigine
- Ipertensione (pressione del sangue aumentata)
- Anemia (basso livello di globuli rossi nel sangue)
- Arrossamento, gonfiore o dolore nella bocca o nella faringe, difficoltà a parlare, raucedine, tosse
- Alterazioni dei valori del sangue che monitorano le sue condizioni generali di salute e le funzioni dei suoi organi (compresi il fegato e i reni)
- Bassi livelli di albumina, magnesio, potassio, calcio o piastrine (cellule del sangue che contribuiscono alla coagulazione del sangue)
- Aumento dei livelli di bilirubina nel sangue (questo può portare a ittero/ingiallimento della pelle e degli occhi) e di altri valori epatici (aumento dei livelli degli enzimi epatici aspartato aminotransferasi, alanina aminotransferasi, fosfatasi alcalina)
- Dolore alle braccia e alle gambe, dolore alle articolazioni
- Affanno
- Riduzione del funzionamento della tiroide con sintomi quali stanchezza, aumento di peso, stitichezza, sensazione di freddo e pelle secca
- Gonfiore alle gambe e alle braccia
- Emorragie e lividi

Comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 100)

- Ascessi (raccolte di pus con gonfiore e infiammazione)
- Disidratazione, la bocca secca ne è un segno precoce
- Rumori auricolari (p. es. tintinnio) (tinnito)
- Coaguli di sangue nelle vene, nelle arterie e nei polmoni (possibili sintomi possono essere dolore, gonfiore, arrossamento delle braccia o delle gambe, mancanza di respiro improvvisa, dolore acuto al petto), pressione sanguigna bassa (ipotensione), infiammazione della mucosa nasale (rinite allergica)
- Alterazione dei valori del sangue utilizzati per il monitoraggio dello stato di salute generale e del funzionamento degli organi (inclusi fegato, reni e pancreas):
 - Riduzione o aumento dei livelli di glucosio nel sangue
 - Riduzione dei livelli di sodio e fosfato nel sangue
 - Aumento dei livelli di potassio, amilasi e lipasi nel sangue
- Aumento dei grassi alimentari (inclusi colesterolo e trigliceridi) nel sangue
- Eritema (arrossamento cutaneo)
- Ipercheratosi (ispessimento degli strati esterni della pelle, callo)



- Intorpidimento, formicolio, bruciore o dolore agli arti
- Infiammazione del pancreas (il sintomo principale è un dolore intenso che insorge improvvisamente al centro dell'addome)
- Lesioni dolorose o aderenze anomale nel corpo (fistole)
- Perforazione del tratto gastrointestinale (buco nell'intestino, incluso addome gonfio)
- Malattia da reflusso gastroesofageo (eruttazione di succo gastrico acido)
- Emorroidi
- Bruciore o sensazione di puntura sulla lingua
- Problemi di deglutizione
- Flatulenza (gonfiore)
- Sensazione di stordimento, confusione o perdita di conoscenza dovuta a problemi al fegato
- Pelle secca, forte prurito, acne
- Alopecia (perdita e diradamento dei capelli), alterazione del colore dei capelli
- Crampi muscolari
- Proteine nelle urine (rilevabili nei test)
- Insufficienza renale
- Riduzione del numero di globuli bianchi (cellule che aiutano a combattere le infezioni)
- Polmonite

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1000)

- Ictus
- Crampi
- Elevata pressione sanguigna
- Riduzione del flusso di bile dal fegato
- Danneggiamento dell'osso mascellare (osteonecrosi mascellare)
- Pneumotorace – polmone collassato con aria intrappolata nello spazio tra il polmone e il torace, che spesso causa fiato corto
- Disturbi della guarigione delle ferite
- Sindrome da encefalopatia posteriore reversibile (disturbo del cervello con sintomi quali mal di testa, disturbi visivi, disorientamento e crampi)
- Insufficienza cardiaca (può includere sintomi come fiato corto, sensazione di stanchezza, svenimenti, gonfiore alle caviglie e alle gambe)

Non nota (la frequenza non può essere stimata sulla base dei dati disponibili)

- Infarto cardiaco
- Dilatazione e indebolimento della parete di un vaso sanguigno o lacerazione della parete di un vaso sanguigno (aneurisma e dissezione di un'arteria)
- infiammazione dei vasi sanguigni della pelle che può manifestarsi come eruzione

I seguenti effetti collaterali sono stati segnalati quando CABOMETYX è stato usato in associazione a nivolumab:

Molto comune (riguarda più di 1 utilizzatore su 10)

- Infezioni delle vie respiratorie superiori



- Riduzione del funzionamento della tiroide – i sintomi possono essere: stanchezza, aumento di peso, stitichezza, sensazione di freddo e pelle secca
- Iperattività della tiroide – i sintomi possono essere: battito cardiaco accelerato, sudorazione e perdita di peso
- Riduzione dell'appetito, alterazione del senso del gusto
- Mal di testa, vertigine
- Ipertensione (pressione del sangue aumentata)
- Difficoltà a parlare, raucedine, tosse, affanno
- Disturbi di stomaco, compresi diarrea, nausea, vomito, disturbi digestivi, dolori addominali e stitichezza
- Arrossamento, gonfiore o dolore nella bocca o nella faringe
- Eruzione cutanea, talvolta con formazione di vescicole, prurito, dolori alle mani o alle piante dei piedi, eruzione cutanea o arrossamento cutaneo
- Dolori alle articolazioni (artralgia), crampi muscolari, debolezza muscolare e dolori ai muscoli
- Proteine nelle urine (rilevate con un apposito test)
- Sensazione di affaticamento e debolezza, febbre ed edemi (gonfiore)
- Test della funzionalità epatica anormali (aumento degli enzimi epatici aspartato aminotransferasi, alanina aminotransferasi o fosfatasi alcalina nel sangue, aumento dei livelli del prodotto di degradazione bilirubina)
- Test della funzionalità renale anormali (aumento dei livelli di creatinina nel sangue)
- Tasso di glucosio nel sangue elevato (iperglicemia) o ridotto (ipoglicemia)
- Riduzione del numero dei globuli rossi (trasportano l'ossigeno), dei globuli bianchi (combattono le infezioni) o delle piastrine (favoriscono la coagulazione del sangue)
- Aumento dei livelli di enzimi che degradano grassi e amido
- Riduzione dei livelli di fosfato nel sangue
- Aumento o riduzione dei livelli di calcio o potassio nel sangue
- Aumento o riduzione dei livelli di magnesio o sodio nel sangue

Comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 100)

- Grave infezione polmonare (polmonite)
- Aumento del numero di alcuni globuli bianchi (chiamati eosinofili)
- Reazione allergica (inclusa reazione anafilattica)
- Escrezione ridotta di ormoni che vengono prodotti nelle ghiandole surrenali (ghiandole poste sopra i reni)
- Disidratazione
- Infiammazione dei nervi (con sordità, debolezza, formicolio o bruciore alle braccia e alle gambe)
- Rumori auricolari (tinnito)
- Secchezza oculare e visione offuscata
- Cambiamento del ritmo cardiaco o della velocità del battito cardiaco, battito cardiaco accelerato, infiammazione del muscolo cardiaco
- Infezione polmonare (polmonite, caratterizzata da tosse e disturbi respiratori), coaguli di sangue nei polmoni e accumulo di liquidi nella zona dei polmoni



- Fuoriuscita di sangue dal naso
- Infiammazione intestinale (colite), bocca secca, dolore nella bocca, infiammazione dello stomaco (gastrite) ed emorroidi
- Infiammazione del fegato (epatite)
- Pelle secca e forte prurito cutaneo
- Alopecia (perdita e diradamento dei capelli), alterazione del colore dei capelli
- Infiammazione delle articolazioni (artrite)
- Insufficienza renale (inclusa insufficienza renale improvvisa)
- Dolori, dolori al petto
- Coaguli di sangue nei vasi sanguigni
- Perdita di peso
- Aumento dei livelli di colesterolo nel sangue
- Aumento dei livelli di trigliceridi nel sangue

Non comune (riguarda da 1 a 10 utilizzatori su 1000)

- Reazioni allergiche associate all'infusione del medicamento nivolumab
- Infiammazione dell'ipofisi, una ghiandola situata alla base del cervello (ipofisite), gonfiore della tiroide (tiroidite)
- Infiammazione transitoria dei nervi che provoca dolori, debolezza e paralisi delle estremità (sindrome di Guillain-Barré); debolezza muscolare e stanchezza senza distrofia muscolare (sindrome miastenica)
- Infiammazione del cervello
- Infiammazione degli occhi (che provoca dolori o arrossamento)
- Infiammazione del muscolo cardiaco
- Infiammazione del pancreas (pancreatite), perforazione intestinale, bruciore o sensazione di dolore alla lingua (glossodinia)
- Malattia della pelle con macchie di pelle rossa ispessita, spesso con desquamazione argentea (psoriasi)
- Orticaria (eruzione pruriginosa)
- Dolorabilità dei muscoli o debolezza muscolare non causata da attività fisica (miopatia), danneggiamento dell'osso mascellare, lesioni dolorose o aderenze anomale nel corpo (fistole)
- Infiammazione dei reni
- Pneumotorace – polmone collassato con aria intrappolata nello spazio tra il polmone e il torace, che spesso causa fiato corto

Non nota (la frequenza non può essere stimata sulla base dei dati disponibili)

- Infiammazione dei vasi sanguigni della pelle che può manifestarsi come eruzione
- Progressiva distruzione e perdita dei dotti biliari intraepatici e ittero

Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico o al suo farmacista, soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Tenere fuori dalla portata dei bambini.



Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore e sull'etichetta. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno del mese indicato.

Non gettare i medicinali nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. I medicinali scaduti o non più necessari, in uso nelle economie domestiche, possono essere consegnati nelle farmacie o nei punti di raccolta. Queste misure aiutano a proteggere l'ambiente.

Indicazione di stoccaggio

Non conservare a temperature superiori a 30 °C.

Il medico o il farmacista, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darne ulteriori informazioni.

Cosa contiene CABOMETYX?

Principi attivi

Il principio attivo è cabozantinib-L-malato.

CABOMETYX 20 mg compresse rivestite con film: ogni compressa contiene cabozantinib-L-malato corrispondente a 20 mg di cabozantinib.

CABOMETYX 40 mg compresse rivestite con film: ogni compressa contiene cabozantinib-L-malato corrispondente a 40 mg di cabozantinib.

CABOMETYX 60 mg compresse rivestite con film: ogni compressa contiene cabozantinib-L-malato corrispondente a 60 mg di cabozantinib.

Sostanze ausiliarie

- *Contenuto della compressa:* cellulosa microcristallina, lattosio, iprolosa, croscarmellosa sodica, biossido di silicio altamente disperso, stearato di magnesio
- *Pellicola di rivestimento:* ipromellosa, titanio biossido (E171), triacetato di glicerile, ossido di ferro (E172)

CABOMETYX 20 mg compresse rivestite con film sono di colore giallo, rotonde, senza linea di frattura e contrassegnate con «XL» da un lato e con «20» sull'altro.

CABOMETYX 40 mg compresse rivestite con film sono di colore giallo, triangolari, senza linea di frattura e contrassegnate con «XL» da un lato e con «40» sull'altro.

CABOMETYX 60 mg compresse rivestite con film sono di colore giallo, ovali, senza linea di frattura e contrassegnate con «XL» da un lato e con «60» sull'altro.

Numero dell'omologazione

66471 (Swissmedic)

Dove è ottenibile CABOMETYX? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia, dietro presentazione della prescrizione medica non rinnovabile.

Le compresse di CABOMETYX sono in vendita in un flacone di plastica contenente 30 compresse.

Nel flacone di plastica sono presenti 3 contenitori con essiccante a base di gel di silice. Lasci questi contenitori di essiccante nel flacone e non li ingerisca.

Titolare dell'omologazione

IPSEN Pharma Schweiz GmbH, Zug

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel dicembre 2025 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

