

Information destinée aux patients

Lisez attentivement la notice d'emballage. Vous y trouverez tous les renseignements importants concernant le médicament. Ce médicament vous a été prescrit par votre médecin ou vous a été remis sans ordonnance par le pharmacien. Pour en tirer le meilleur bénéfice, veuillez l'utiliser conformément à la notice d'emballage ou, le cas échéant, aux indications de votre médecin ou de votre pharmacien. Conservez cette notice d'emballage pour pouvoir la relire plus tard si nécessaire.

Gouttes Dr. Reckeweg® R50 Sacrogynol

Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R50 Sacrogynol sont-elles utilisées?

Selon la conception homéopathique, les gouttes Dr. Reckeweg® R50 Sacrogynol peuvent être utilisées en cas de douleurs lombaires chez la femme.

De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?

Si votre médecin vous a prescrit d'autres médicaments, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si les gouttes Dr. Reckeweg® R50 Sacrogynol peuvent être prises simultanément. Si les troubles persistent, consulter le médecin.

Quand les gouttes Dr. Reckeweg® R50 Sacrogynol ne doivent-elles pas être utilisées ou seulement avec précaution?

Aucune limitation d'emploi n'est connue à ce jour. Si le médicament est utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné, aucune précaution particulière n'est requise.

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous

- souffrez d'une autre maladie,
- êtes allergique,
- prenez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Les gouttes Dr. Reckeweg® R50 Sacrogynol peuvent-elles être prises/utilisées pendant la grossesse ou l'allaitement?

Les gouttes Dr. Reckeweg® R50 Sacrogynol ne doivent pas être utilisées durant la grossesse sans l'avis du médecin.

Comment utiliser les gouttes Dr. Reckeweg® R50 Sacrogynol?

Sauf prescription contraire du médecin, les adultes prennent 10 à 15 gouttes 3 à 4 fois par jour diluées dans un peu d'eau avant les repas. Après amélioration, prendre 5 à 10 gouttes 1 à 2 fois par jour pendant environ 3 mois. Veuillez vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si l'amélioration escomptée de l'enfant en bas âge / de l'enfant ne se produit pas, faites-le examiner par un médecin. Adressez-vous à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre droguiste si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Quels effets secondaires les gouttes Dr. Reckeweg® R50 Sacrogynol peuvent-elles provoquer?

L'emploi approprié du médicament n'a donné lieu à aucun effet secondaire attesté à ce jour. Si vous remarquez toutefois des effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. La prise de médicaments homéopathiques peut aggraver passagèrement les troubles (aggravation initiale). Si cette aggravation persiste, cessez le traitement avec les gouttes Dr. Reckeweg® R50 Sacrogynol et informez votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP» sur le récipient. Conserver à température ambiante (15-25° C) et hors de portée des enfants. Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien. Les gouttes contiennent 35% vol. d'alcool.



Que contiennent les gouttes Dr. Reckeweg® R50 Sacrogynol?

10 ml contiennent: Aesculus hippocastanum D6 1 ml, Cimicifuga racemosa D4 1 ml, Colocynthis D6 1 ml, Natrium chloratum D30 1 ml, Phytolacca americana D8 1 ml, Strontium carbonicum D12 1 ml, Strychnos nux-vomica (Nux vomica) D30 1 ml. Contient 35% vol. d'alcool.

Numéro d'autorisation

45078

Où obtenez-vous les gouttes Dr. Reckeweg® R50 Sacrogynol? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

En pharmacie, sans ordonnance médicale. Flacons compte-gouttes de 50 ml.

Titulaire de l'autorisation

Laboratoire Jacques Reboh et fils SA

Route de la Glâne 4

CH-1680 Romont

Fabricant

Pharmazeutische Fabrik Dr. Reckeweg & Co. GmbH

D - 64625 Bensheim

Cette notice d'emballage a été vérifiée pour la dernière fois en 11/2004 par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

