

Informazione destinata ai pazienti

Legga attentamente il foglietto illustrativo che contiene importanti informazioni.

Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia o in drogheria. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del medico, del farmacista o del droghiere. Conservi il foglietto illustrativo per poterlo rileggere all'occorrenza.

WALA Euphrasia gocce oftalmiche monodosi, gocce oftalmiche

Medicamento antroposofico

Quando si usano le gocce oftalmiche monodosi WALA Euphrasia?

Secondo la concezione antroposofica dell'uomo e della natura le gocce oftalmiche monodosi WALA Euphrasia si possono usare negli stati infiammatori leggeri della congiuntiva quali congiuntivite catarrale, congiuntiva irritata dal vento, dalla polvere o dal polline, come pure in caso di occhi stanchi, lacrimanti. L'uso di questo medicamento nel settore di applicazione citato si basa sui principi della concezione antroposofica dell'uomo e della natura.

Di che cosa occorre inoltre tener conto durante il trattamento?

Se il suo medico le ha prescritto altri medicamenti, chieda al suo medico o al suo farmacista se simultaneamente può usare le gocce oftalmiche monodosi WALA Euphrasia.

Quando non si possono assumere/usare le gocce oftalmiche monodosi WALA Euphrasia e quando la loro somministrazione/il loro uso richiede prudenza?

In caso di nessun miglioramento (dopo 2-3 giorni di trattamento) o in caso di peggioramento persistente consulti immediatamente un medico. In caso di glaucoma usare soltanto sotto sorveglianza medica. Per i lattanti e per i bambini nella prima infanzia fino ai 24 mesi non sono ancora disponibili esperienze sufficientemente documentate. Per questo motivo il medicamento deve essere usato, in questi gruppi di età, soltanto su prescrizione medica.

Informi il suo medico, il suo farmacista o il suo droghiere, nel caso in cui

- offre di altre malattie
- offre di allergie o
- assume altri medicamenti o li applica sull'occhio (anche acquistati di sua iniziativa).

Si possono assumere/usare le gocce oftalmiche monodosi WALA Euphrasia durante la gravidanza o l'allattamento?

In base alle esperienze fatte finora, non sono noti rischi per il bambino se il medicamento è usato correttamente. Tuttavia, non sono ancora state eseguite indagini scientifiche sistematiche. Per prudenza dovrebbe rinunciare nella misura del possibile ad assumere medicamenti durante la gravidanza e l'allattamento o chiedere consiglio al proprio medico, farmacista o droghiere.

Come usare le gocce oftalmiche monodosi WALA Euphrasia?

Salvo diversa prescrizione medica, nei bambini a partire dai 2 anni, negli adolescenti e negli adulti, instillare 1 goccia nel sacco congiuntivale 3 volte al giorno.



Istruzioni per l'uso

Evitare il contatto tra il contenitore monodose e l'occhio!

Apertura: separare un contenitore dalla striscia e aprirlo ruotando le alette piatte.

Istruzioni per l'instillazione: chinare la testa all'indietro. Con l'indice di una mano tirare lievemente in basso la palpebra inferiore. Con l'altra mano premere lievemente con un dito sul contenitore per far erogare una goccia del liquido nel sacco congiuntivale. Quindi, tenere l'occhio aperto, se possibile, e muoverlo affinché il liquido possa distribuirsi uniformemente.



Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico. Se in caso di trattamento di un bambino non si ottiene il miglioramento desiderato, lo faccia visitare da un medico. Se ritiene che l'azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere.

Quali effetti collaterali possono avere le gocce oftalmiche monodosi WALA Euphrasia?

Possono manifestarsi irritazioni agli occhi, quali bruciore, arrossamento, prurito, gonfiore o aumento della lacrimazione. Se osserva effetti collaterali, si rivolga al suo medico, al suo farmacista o al suo droghiere soprattutto se si tratta di effetti collaterali non descritti in questo foglietto illustrativo.

Di che altro occorre tener conto?

Il medicamento non dev'essere utilizzato oltre la data indicata con «EXP» sul contenitore.

Indicazione di stoccaggio

Non conservare a temperature superiori a 30 C.

Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori indicazioni

Le gocce oftalmiche monodosi WALA Euphrasia non contengono conservanti e vanno quindi aperte solo immediatamente prima dell'uso. Una volta aperte, le monodosi non sono stabili e non si possono conservare.

Il medico, il farmacista o il droghiere, che sono in possesso di un'informazione professionale dettagliata, possono darle ulteriori informazioni.

Cosa contengono le gocce oftalmiche monodosi WALA Euphrasia?

1 ml (33 gocce) di liquido contiene:

Principi attivi

100 mg di euphrasia ex planta tota ferm 33c (HAB) D2, 100 mg di rosae aetheroleum D7 (HAB 5a)

Sostanze ausiliarie

7.04 mg di sodio cloruro; 0.16 mg di sodio bicarbonato; acqua per preparazioni iniettabili

Numero dell'omologazione



55043 (Swissmedic)

Dove sono ottenibili le gocce oftalmiche monodosi WALA Euphrasia? Quali confezioni sono disponibili?

In farmacia e in drogheria, senza prescrizione medica.

Le gocce oftalmiche monodosi WALA Euphrasia sono in vendita in confezioni 15 monodosi contenenti ciascuno 0.5ml di liquido

Titolare dell'omologazione

WALA Schweiz AG, 3011 Berna

Fabbricante

WALA Heilmittel GmbH, D-73085 Bad Boll/Eckwälden

Questo foglietto illustrativo è stato controllato l'ultima volta nel giugno 2021 dall'autorità competente in materia di medicinali (Swissmedic).

